



## Contactgegevens

### Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht  
Weizigtweg 11  
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer  
Europaweg 151  
2711 ER Zoetermeer

### Postadres voor beide vestigingen

Weizigtweg 11  
3314 JJ Dordrecht

**T:** 085 04 10 150

**F:** 085 04 10 152

**E:** [contact@excellentklinieken.nl](mailto:contact@excellentklinieken.nl)

**W:** [www.excellentklinieken.nl](http://www.excellentklinieken.nl)





Door een beschadiging/overgevoeligheid van een perifere zenuw ervaart u chronische neuropatische (zenuw) pijn. .

### Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken zijn:

- Operaties
- Trauma

### Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

### Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

### Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

### Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

### Behandeling

Voor de zenuwbehandeling zijn er de volgende methoden:

*Proefblokkade:* Als niet duidelijk is welke zenuw de pijn veroorzaakt wordt er gestart met een proefblokkade. De zenuw wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstiller.

*Therapeutische injectie:* Rond de zenuw wordt een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid) toegediend.

De ontstekingsremmer vermindert de zwelling van de zenuw, waardoor de zenuw tot rust kan komen en kan herstellen.

*PRF-behandeling:* De zenuw wordt gedurende 4 minuten behandeld met gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Met deze korte stroomstootjes wordt de pijnprikkel van de zenuw geremd waardoor u minder pijn gaat ervaren. Hier voelt u weinig tot niets van. Soms wordt een PRF-behandeling gecombineerd met een therapeutisch injectie.

De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd. Met echografie of of rontgendoorlichting wordt de zenuw opgezocht en de naald ingebracht.

Om te controleren of de naald dicht bij de zenuw staat wordt er een elektrisch stroompje via de naald gegeven. Dit veroorzaakt een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel. Daarna wordt de behandeling uitgevoerd.

### Complicaties en bijwerkingen

- Er kan tijdelijk verlies in het aangedane gebied optreden
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
- Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus tijdelijk onregelmatig zijn door de corticosteroiden.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

Na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

### Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na een aantal weken. Rond deze tijd heeft u een controleafspraak. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

### Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met het pijncentrum, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: [contact@excellentklinieken.nl](mailto:contact@excellentklinieken.nl)

