


Perifere zenuwbehandeling lies

(genitofemoralis of Ilio-inguinalis/iliohypogastricus zenuw)



Contactgegevens

Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht
Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer

Postadres voor beide vestigingen

Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

T: 085 04 10 150

F: 085 04 10 152

E: contact@excellentklinieken.nl

W: www.excellentklinieken.nl

 **excellent klinieken**
pijn- en neuromodulatiecentrum

 **excellent klinieken**
pijn- en neuromodulatiecentrum



Door een beschadiging/overgevoeligheid van de genitofemoralis of Ilio- inguinalis/iliohypogastricus zenuw heeft u pijn in de lies en onderbuik die kan uitstralen naar de geslachtsdelen en het bovenbeen.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken zijn:

- Buikoperatie (liesbreukoperatie, keizersnede, blindedarmoperatie, bekkenoperatie, nieroperatie).
- Zwangerschap.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandeling

Voor de zenuwbehandeling zijn er de volgende methoden:

Proefblokkade: Als niet duidelijk is welke zenuw de pijn veroorzaakt wordt er gestart met een proefblokkade. De zenuw wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstiller.

Therapeutische injectie: Rond de zenuw wordt een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid) toegediend. De ontstekingsremmer vermindert de zwelling van de zenuw, waardoor de zenuw tot rust kan komen en kan herstellen.

PRF-behandeling: De zenuw wordt gedurende een aantal minuten behandeld met gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Met deze korte stroomstootjes wordt de pijnleiding van de zenuw

geremd en neemt de pijn af. Hier voelt u weinig tot niets van. Soms wordt een PRF-behandeling gecombineerd met een therapeutisch injectie. Tijdens deze behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd en eventueel verdoofd. Met echografie wordt de zenuw opgezocht en de naald ingebracht. Om te controleren of de naald dicht bij de zenuw staat wordt er een elektrisch stroompje via de naald gegeven. Dit veroorzaakt een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel. Daarna wordt de behandeling uitgevoerd.

Complicaties en bijwerkingen

- Er kan tijdelijk kracht- en/of gevoelsverlies van het been optreden.
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
- Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus tijdelijk ontregeld zijn door de corticosteroiden.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

Na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na een aantal weken. Rond deze tijd heeft u een controleafspraak. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Excellent Klinieken, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: contact@excellentklinieken.nl.

