


RACZ behandeling *epidurale adhesiolysis*



Contactgegevens

Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht
Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer

Postadres voor beide vestigingen

Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht


T: 085 04 10 150

F: 085 04 10 152

E: contact@excellentklinieken.nl

W: www.excellentklinieken.nl





Indicatie

Door verklevingen en/of littekenweefsel rondom een zenuwwortel heeft u ruggijn met uitstralende pijn naar het been. Afhankelijk van welke zenuw geïrriteerd is, straalt de pijn uit naar een bepaald deel van het been.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken van verklevingen of littekenweefsel rondom een zenuwwortel zijn:

- Irritatie van een zenuwwortel door druk en/of het vrijkomen van stoffen die de zenuw irriteren.
- Littekenpijn: pijn die ontstaat na een operatie. De zenuw raakt geïrriteerd doordat deze beklemd wordt door littekenweefsel.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Behandeling

Bij een RACZ behandeling wordt geprobeerd inwendige verklevingen en/of littekenweefsel los te maken (epidurale adhesiolysis) door het inspuiten van een combinatie van medicijnen. De behandeling is genoemd naar professor Racz die deze techniek voor het eerst beschreef. Bij de behandeling komt u in buikligging op de behandelafel te liggen. Onder uw buik wordt een kussen geplaatst om de holling van uw rug minder te maken. De plaats van injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Onder röntgendoorlichting wordt via een opening net boven het staartbeen een naald in gebracht waardoor een dun slangetje (katheter) wordt opgevoerd tot bij de verklevingen en/of littekenweefsel.

De verklevingen en/of littekenweefsel worden met contrastvloeistof zichtbaar gemaakt. Vervolgens krijgt u via de katheter verdovingsvloeistof, ontstekingsremmend middel (corticosteroïd) en een enzym (hyaluronidase) toegediend. Met de combinatie van deze stoffen wordt geprobeerd de verklevingen en/of het littekenweefsel lossen te maken.

Complicaties en bijwerkingen

- Doordat de verklevingen en het ruggenmergvlies dicht op elkaar liggen kan het heel soms voorkomen dat het ruggenmergvlies wordt aangeprikt. Hierdoor kan hoofdpijn ontstaan. Deze verdwijnt meestal vanzelf. Wij raden u dan aan om veel te drinken en zo nodig een paar dagen plat te liggen.
- Er kan tijdelijk kracht- en/of gevoelsverlies van de benen optreden.
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
- Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus tijdelijk onregelmatig zijn.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met het pijncentrum, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: contact@excellentklinieken.nl.

