

Lumbaal sympaticus blokkade



Contactgegevens

Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht
Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer
Europaweg 151
2711ER Zoetermeer

Postadres voor beide vestigingen


Spuiboulevard 334
3311 GR Dordrecht

T: 085 04 10 150

F: 085 04 10 152


E: contact@excellentklinieken.nl

W: www.excellentklinieken.nl



 **excellent klinieken**
pijn- en neuromodulatiecentrum

 **excellent klinieken**
pijn- en neuromodulatiecentrum



Indicatie

Het sympathisch zenuwstelsel maakt deel uit van het onwillekeurig zenuwstelsel (over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle). Deze zenuwbundel loopt aan de voor- buitenzijde van de wervelkolom. Het sympathisch zenuwstelsel heeft o.a. invloed op de doorbloeding van het lichaam, transpiratie en de pijngeleiding van het lichaam.

Oorzaken

Oorzaken van pijn in de ledematen kunnen zijn:

- complex regionaal pijnsyndroom
- zenuwbeschadiging
- doorbloedingsstoornissen

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD:

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling. .

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Behandeling

Voor de zenuwbehandeling zijn er de volgende methoden:

Proefblokkade:

Een deel van het sympathisch zenuwstelsel wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstillers. Deze behandeling wordt gedaan om te testen of een blokkade van het sympathisch zenuwstelsel uw pijn kan verminderen.

Als de verdoving duidelijk uw pijn vermindert, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor de definitieve behandeling (RF- denervatie / behandeling met fenol/alcohol).

Therapeutische behandeling:

Therapeutische injectie: injectie met verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid). De ontstekingsremmer vermindert irritatie waardoor de zenuwbundel tot rust kan komen en kan herstellen.

RF (radiofrequente)-denervatie / fenol of alcohol behandeling:

De pijngeleiding wordt onderbroken door middel van een radiofrequente stroom of behandeling met fenol/alcohol. De pijngeleiding wordt hierdoor voor langere tijd geremd. De keuze is afhankelijk van de oorzaak van uw pijn. Er wordt rond de zenuwknoop een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid) ingespoten.

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats van de behandeling bepaald. De plaats van de injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt de pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) naar de juiste plaats. Met contrastvloeistof en/of een klein elektrisch stroompje wordt de positie van de naaldpunt gecontroleerd. Als de naald(en) goed staat wordt de RF-behandeling uitgevoerd of wordt de medicatie rond de plexus/zenuw gespoten.

Complicaties en bijwerkingen

- Tijdelijk optreden van lage bloeddruk. Dit kan duizeligheidsklachten geven bij plotseling rechtop zitten en staan.
- Bij dubbelzijdige behandeling kan er impotentie ontstaan.
- Er kan tijdelijk zwelling en warmte optreden van het behandelde ledemaat.
- Tijdelijke zenuwpijn of doof gevoel in het behandelde gebied.

Na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met het pijncentrum, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: contact@excellentklinieken.nl.

