


Plexus hypogastricus blokkade



Contactgegevens

Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht
Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer
Europaweg 151
2711ER Zoetermeer

Postadres voor beide vestigingen

Spuiboulevard 334
3311 GR Dordrecht

T: 085 04 10 150

F: 085 04 10 152

E: contact@excellentklinieken.nl

W: www.excellentklinieken.nl





Indicatie

De plexus hypogastricus is een vlechtwerk van zenuwen dat een rol speelt in de pijngeleiding van de organen in het bekken, zoals de baarmoeder, prostaat, de blaas en het laatste deel van de dikke darm.

Oorzaken

Oorzaken van pijn in de onderbuik/bekken kunnen zijn:

- gynaecologische oorzaken, zoals endometriose, verklevingen, chronische ontstekingen;
- niet gynaecologische oorzaken: chronische ontsteking van de blaas, darmen of na operatie / bestraling in het bekken;
- kwaadaardige tumoren van de prostaat, baarmoeder, eileiders en blaas.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmetingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandeling

Proefblokkade: de plexus wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstiller. Deze behandeling wordt gedaan om te testen of een blokkade van de plexus uw pijn kan verminderen. Vermindert uw pijn hiermee, dan volgt de definitieve behandeling (RF- denervatie / behandeling met fenol). Hiervoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

RF (radiofrequente)-denervatie / fenol of alcohol behandeling: de pijngeleiding kan worden onderbroken door middel van een radiofrequente stroom of behandeling met fenol/alcohol. De pijngeleiding wordt hierdoor voor langere tijd geremd. De keuze is afhankelijk van de oorzaak van uw pijn.

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. De plexus ligt aan de voorzijde van de onderste lendewervel (onderin de rug). Hier vindt dus ook de behandeling plaats. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats van de behandeling bepaald. De plaats van de injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt de pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) naar de juiste plaats. Met contrastvloeistof en een klein elektrisch stroompje wordt de positie van de naaldpunt gecontroleerd. Als de naald(en) goed staat wordt de RF-behandeling uitgevoerd of wordt de fenol/alcohol rond de plexus gespoten. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Complicaties en bijwerkingen

- Tijdelijk optreden van diarree.
- Een tweezijdige hypogastricus blokkade kan impotentie veroorzaken.
- Tijdelijk optreden van lage bloeddruk. Dit kan duizeligheidsklachten geven bij plotseling rechtop zitten en staan.

Na de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met het pijncentrum, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: contact@excellentklinieken.nl.

