



Contactgegevens

Excellent Klinieken

Lokatie Dordrecht
Weizigtweg 11
3314 JJ Dordrecht

Lokatie Zoetermeer
Europaweg 151
2711ER Zoetermeer

Postadres voor beide vestigingen

Spuiboulevard 334
3311 GR Dordrecht

T: 085 04 10 150

F: 085 04 10 152

E: contact@excellentklinieken.nl

W: www.excellentklinieken.nl





Sweet behandeling

Sweet behandeling wordt ook wel blokkade van het ganglion van Gasser genoemd. Dit ganglion is de zenuwknoop van de aangezichtszenuw (nervus Trigeminus). Deze zenuwknoop ligt in de schedel. Uit de zenuwknoop ontspringen drie vertakkingen naar gebieden in het gezicht (het voorhoofd en de regio van de boven- en de onderkaak).

Oorzaken

De precieze oorzaak van aangezichtspijn is vaak niet bekend.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

- een bloedvat dat tegen de zenuw drukt;
- een tumor;
- ontsteking (gordelroos; multiple sclerose).

Indicatie

Aangezichtspijn die onvoldoende reageert op medicamenteuze behandeling.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Nuchter zijn

U moet voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u tot 6 uur voor de behandeling mag eten en drinken en tot 2 uur voor de behandeling heldere vloeistoffen mag drinken, zoals water, vruchtensap zonder vruchtvlees en koffie of thee zonder melk. Daarna mag u niets meer eten en drinken. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met een lichte sedatie (roesje). Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Uw hoofd wordt gefixeerd met tape. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats van de behandeling bepaald. De plaats van de injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt de pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) naar de juiste plaats.

Met elektrische stroom wordt de positie van de naaldpunt gecontroleerd. Hiervoor laten we u dus "wakker" worden" Als de naald(en) goed staat wordt de RF-behandeling uitgevoerd. Door radiofrequente stroom wordt de pijngeleiding onderbroken. De pijngeleiding wordt hierdoor voor langere tijd geremd. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Complicaties en bijwerkingen

- Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard.
- Er kan een verdoofd gevoel optreden in het behandelde gebied. Ook dit verdwijnt of vermindert na enige tijd.
- Heel zelden kunnen er mondbacteriën in het hersenvocht komen wat kan leiden tot hersenvliesontsteking. Hierbij ontstaat binnen een tijdsbestek van 6 uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. In dat geval moet zo snel mogelijk een behandeling met antibiotica worden gestart. Neemt u bij het ontstaan van koorts (meer dan 38,5°C) binnen genoemd tijdsbestek contact op met pijncentrum of met uw huisarts.

U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen.

Resultaat

Na een aantal weken wordt een controleafspraak gemaakt om het resultaat van de behandeling te beoordelen en wordt zo nodig verdere behandeling met u besproken.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met het pijncentrum, telefoonnummer: 085 0410 150, emailadres: contact@excellentklinieken.nl.

